



מקס[®] בור-אבץ

6% Zn, 7% B, 0.5% Mo

5
ליטר

תכשיר נוזלי מרוכז המכיל אבץ, בורון ומוליבדן

מכיל:

אבץ 6%, בורון 7%, מוליבדן 0.5%

בור-אבץ מכיל שילוב מיקרואלמנטים בריכוז אופטימלי לשיפור הפריחה, ההאבקה וייצור סוכרים.

קרא בעיון את התווית לפני השימוש!

אבץ יוצר אנזים השומר על רמות CO2 לצורך פוטוסינתזה. אבץ ממלא תפקיד חשוב בייצור אוקסין, הורמון גדילה צמחי.

נער היטב את מכל התכשיר לפני השימוש!

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד!
ليس للاستعمال المنزلي - للاستعمال الزراعي فقط.

בורון נחוץ לתנועת הסוכרים בתוך הצמח וכן ליצירת תאים חדשים בקודקודי הגידול. בורון משפיע גם על האבקה והתפתחות זרעים.

מס' הייצור ותאריך ייצור מופיעים על גבי האריזה.
מיוצר ע"י חברת Agrichem - Australia
משווק ע"י ביו-יום, צור יגאל
עדכון תווית: 7/2024

מוליבדן ממלא תפקיד חיוני בחילוף החומרים של החנקן, הוא מספק את החנקן הדרוש למרכיבים חיוניים בתאים כגון חלבונים וכלורופיל. קיבוע חנקן בקטניות תלוי במוליבדן.

SUPA 3ZBM



מקס בור-אבץ

הוראות שימוש

אזהרות: התכשיר מסוכן בבליעה.

אמצעי זהירות ומיגון: יש לבלוש בגדי עבודה ארוכים עליהם סרבל עמיד לכימיקלים, נעלי עבודה סגורות וכובע לכיסוי ולהגנה על השיער. לבש כפפות ניטריל או PVC (לפי תקן EN-374/3). הרכב משקפי מגן עם אטימה מהצד (לפי תקן EN-166), אל תאכל או תשתה בזמן העבודה, אל תעשן בזמן העבודה. הימנע מבליעת ושאיפת התכשיר או התרסיס וממגע ישיר בעור ובעיניים.

הכנת התרסיס: מלא את מכל המרסס עד מחציתו במים. ערבב בצד את הכמות הדרושה של מקס אלמנטס עם כמות מעטה של מים עד קבלת תמיסה אחידה. הוסף את התמיסה שהכנת לתוך מכל המרסס תוך כדי בחישה והשלם את כמות המים החסרה. יש להמשיך להפעיל את מערכת הערבול עד תום הריסוס.

כללי: אין לרסס בתנאי מזג אויר קיצוניים כגון קרה או שרב, או כאשר הגידול נמצא בתנאי עקה כגון יובש, חום או סובל מנדקי קרה.

אופן היישום:

הגידול	ריסוס עלותי - המינון (סמ"ק/ד') או הריכוז (%)	הגמעה - המינון (סמ"ק/ד')	הערות
אבוקדו, בננה, הדרים, מנגו, רימון, זית	0.05%-0.25%	300-600	שני יישומים, יישום באביב ויישום אחרי קטיף
שקד, אפרסק, נקטרינה, דובדבן, משמש, שזיף תפוח, אגס	0.05%-0.2%	150-350	אין לרסס ריסוס עלותי במהלך עונת הגידול, יישום בפקע ורוד ולאחר קטיף לפני השלכת
	0.05%-0.2%	150-350	
עגבנייה, מלפפון, מלפל, חציל, קישוא, אבטיח. מלון, תות שדה	0.05%-0.15%	200-300	יישום 3 שבועות לאחר שתילה, המשך במרווחים של 2-3 שבועות לפי הצורך
כרוב, כרובית, ברקולי, חסה, בזיל, תבלינים	0.05%-0.2%	300-600	1. שבועיים לאחר שתילה 2. שבועיים לאחר מכן
גזר, תפוז, א, בצל, סלק, בטטה, בוטנים	0.05%-0.2%	300-600	1. שבוע לאחר 100% הצצה 2. שבועיים לאחר מכן
גפן	0.07%-0.25%	300-500	1. כשהשריגים באורך 10 ס"מ 2. 5% בפריחה
כותנה, חיטה, תירס, חימצה	0.05%-0.2%	150-200	בעלה חמישי

שילובים: יש לבצע בדיקת בטיחות מקדימה לפני שילוב מקס בור-אבץ בתכשירי הדברה והזנה אחרים.

עזרה ראשונה:

אם חדר חומר **לעיניים** - שטוף אותן בזרם מים חלש במשך 15 דקות ופנה לרופא.
במקרה של **בליעה** פנה את הנפגע לרופא והצג בפניו תווית זו.
במקרה של מגע **בעור** או בחלקי גוף חשופים יש לשטוף במים ובסבון ואחר כך במים זורמים במשך 15 דקות.

מידע לרופא:

מספר הטלפון של המרכז הארצי למידע בהרעלות בבית חולים רמב"ם: **04-7771900**
תנאי מכירה: היצרנים והמפיצים של תכשיר זה משוכנעים ביעילותו, אולם היות שאין באפשרותם לפקח על אופן השימוש בתכשיר והתנאים בעת השימוש בו, אין הם אחראים לכל התוצאות והנזקים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש בתכשיר זה, זה לפי ההוראות

